

# RX 230

FLEXIBILIDADE DE MANEJO  
E PROTEÇÃO EFICIENTE  
DO SOLO.

## Benefícios:

### Cobertura persistente do solo

Proteção contra erosão e supressão de plantas daninhas.



### Elevado aporte de N e K

Favorece a fertilidade e o equilíbrio do solo, permitindo maiores produtividades para a próxima cultura.



### Solo vivo e resiliente

Manejo estratégico para altas produtividades.



## Características:

CURTO

MÉDIO

LONGO

**Ciclo:** 90 a 120 dias<sup>1</sup>

**Ambiente de produção:** Médio e Alto

**Índice de MS:** 10 - 15%

**Relação C/N:** > 20

**Faixa de Dosagem:** 30 - 40 kg/ha


<sup>1</sup>Ciclo varia conforme manejo e a época de semeadura.

## Composição do mix:

- Aveia Branca IPR Esmeralda;
- Aveia Preta Embrapa 139;
- Ervilhaca Soberana.



## Ciclagem de Nutrientes



Fonte: Pesquisa e Inovação Raíx 2025.

## Painel de Resultados do RX 230



Média de resultados de **RX 230** em relação à média da testemunha: Aveia Preta Embrapa 139.

CARACTERÍSTICA	RESULTADOS
Produção de Biomassa	<b>+69%</b>
Produção de Massa Seca	<b>+14%</b>
Ciclagem de Nutrientes	<b>+55%</b>
Produtividade de Soja	<b>+12%</b>

## PIMM Planejamento e Implantação:

Época recomendada de semeadura: **Abril a Junho**      Profundidade de semeadura: **2 a 3 cm**

Sugestão de dose para semeadura:

Linha - kg/ha	Lanço - kg/ha
Ambiente de Produção Alto/Médio	Ambiente de Produção Alto/Médio
30	40

**Monitoramento:** Lagartas, vaquinhas, percevejos e pulgões.

## Manejo final do produto:

### Manejo 01

**Manejo parcial:** Recomenda-se realizar o manejo com graminicida no início da emissão de panícula das gramíneas. Recomenda-se realizar o manejo da ervilhaca em média 30 dias antes da semeadura da cultura comercial.

### Manejo 02

**Dessecação total:** Recomenda-se realizar a dessecação total e/ou manejo com rolo faca em pleno florescimento das espécies e/ou 30 a 35 dias antes da semeadura da cultura comercial, ou conforme a tabela ao lado:

<sup>1</sup>Dessecação – refere-se a dessecação com utilização de herbicidas e com condições climáticas favoráveis

Produção de MS (t/ha)	Intervalo entre o manejo do mix até a semeadura da cultura comercial	
	Dessecação <sup>1</sup>	Dessecação <sup>1</sup> + Rolo - faca
< 5	45 dias	40 dias
5 - 7	50 dias	45 dias
> 7	55 dias	50 dias