

RX 610

NA ESTIAGEM, SEGURANÇA
PROLONGADA

Benefícios:

Mais vida no solo

Aumento da atividade biológica do solo.



Rápida cobertura

Maior supressão de plantas daninhas e proteção contra erosão.



Campeão de produtividade

Máximo ganho nutricional para as culturas comerciais.



Características:

CURTO

MÉDIO

LONGO

Ciclo: 130 a 160 dias¹

Ambiente de produção: Médio e Alto

Índice de MS: 12 - 14%

Relação C/N: < 20

Faixa de Dosagem: 40 - 50 kg/ha


¹Ciclo varia conforme manejo e a época de semeadura.

Composição do mix:

- Aveia Preta IPR 61
- Nabo Japonês Minowase
- Ervilhaca SS Combate
- Ervilhaca SS Esmeralda



Ciclagem de Nutrientes



Fonte: Média de resultados de 2022, 2023 e 2024 – Pesquisa e Inovação, Raix BioSoluções.

Painel de Resultados do RX 610



Média de resultados de **RX 610** em relação à média das testemunhas: Aveia IPR 61¹ e Centeio².

CARACTERÍSTICA	RESULTADOS
Produção de Massa Seca ¹	+36%
Produção de Biomassa ¹	+120%
Ciclagem de Nutrientes ¹	+132%
Produção de Raízes ²	+89%
Produtividade de Soja ¹	+17%
Produtividade do Milho ¹	+16%

PIMM

Planejamento e Implantação:

Época recomendada de semeadura: **Abril a Agosto** | Profundidade de semeadura: **2 a 3 cm**

Sugestão de dose para semeadura:

Linha - kg/ha	Lanço - kg/ha
40	50

Monitoramento:

Lagartas, vaquinhas, percevejos e pulgões.

Manejo final do produto:

Manejo 01

Manejo parcial: Recomenda-se realizar o manejo com graminicida em pleno florescimento das gramíneas. Recomenda-se realizar o manejo das ervilhacas em média 30 dias antes da semeadura da cultura comercial.

Manejo 02

Dessecação total: Recomenda-se realizar a dessecação total e/ou manejo com rolo faca em pleno florescimento das espécies e/ou 30 a 35 dias antes da semeadura da cultura comercial, ou conforme a tabela ao lado:

¹Dessecação – refere-se a dessecação com utilização de herbicidas e com condições climáticas favoráveis

Produção de MS (t/ha)	Intervalo entre o manejo do mix até a semeadura da cultura comercial	
	Dessecação ¹	Dessecação ¹ + Rolo - faca
< 5	30 dias	25 dias
5 - 6	35 dias	30 dias
> 6	45 dias	40 dias